

17 JUNI 2022

BULLETTIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

A. INFORMATIE OVER COVID-19



Het aantal besmettingen blijft voorlopig verder stijgen. Dit wordt gedreven door de nieuwe BA.5 variant en in mindere mate BA.4. We zien ook een stijging van de ziekenhuisopnames, met voorlopig weinig impact op intensieve zorgen of het aantal overlijdens. De belasting voor de zorg is momenteel beperkt en ook voor de komende weken verwachten we géén zware belasting voor de zorg.

Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 7 tot 13 juni)



+ 79%

Nieuwe gevallen

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 230/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 3,6/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** is toegenomen (+ 79%) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is ook gestegen en is groter dan de waarde van 1 (1,398).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is verder gestegen (+ 20%) in de week van 10 tot 16 juni, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** is tegelijkertijd afgenomen (- 34 %).
- **De COVID-19 mortaliteit** is toegenomen. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 21 (30/5-5/6) was er geen statistisch significante oversterfte bij de algemene Belgische bevolking.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is stabiel gebleven (15 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 16 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten zijn ook stabiel gebleven met 51 consulten per 100.000 inwoners per week.
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie vertoont een stijging van het aantal nieuwe gevallen onder WZC-bewoners en onder personeelsleden, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder de bewoners en het aantal clusters. De aantallen blijven echter laag.



+ 20%

Nieuwe
ziekenhuisopnames

- De **Omikron variant BA.2** was nog steeds dominant in de 2 weken van 30 mei tot 12 juni 2022. Hij vertegenwoordigde bijna 48% van de onderzochte stalen. De Omikron-variant BA.2.12.1 vertegenwoordigde 7,3%, BA.4 vertegenwoordigde 6,9%, en BA.5 37,4%.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 7 tot 13 juni 2022)



Het aantal uitgevoerde testen is toegenomen, met een dagelijks gemiddelde van 11.234 testen. De positiviteitsratio is verder toegenomen (bijna 22 %).

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 14 juni bedroeg de vaccinatiegraad voor een booster-dosis bij volwassenen 75,4%. Het risico op hospitalisaties en opnames op intensieve zorgen is gereduceerd met respectievelijk 67 % en 50 % bij mensen van 65 jaar en ouder na een booster-dosis, tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd zonder booster-dosis.

In totaal ontvingen 416.000 inwoners van ons land (3,5%) reeds een 2^e booster.

Bron: Sciensano

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://sciensano.be) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

4. Middellang ziekteverzuim volgt coronagolven


Het **middellang ziekteverzuim** – werknemers die tot 30 dagen afwezig blijven wegens ziekte – is in vergelijking met 2021 hoog gebleven. Zoals de grafiek hieronder aantoont, volgen de cijfers de coronagolven. In december 2021 zorgde de delta-variant voor meer zieken. Daarna volgde er een daling, maar door de omikron-variant in januari 2022 nam het middellang verzuim opnieuw toe, met een piek van 4,66%. Veel werknemers moesten thuisblijven, al werd men doorgaans minder ziek van de omikron-variant.

Wanneer de omikron-piek eind februari over zijn hoogtepunt heen was, nam ook het ziekteverzuim opnieuw af. In maart en april van 2022 steeg het middellang verzuim echter weer tot net boven de 4%. Dat was te wijten aan twee factoren: de griep en corona.

Het **langdurig ziekteverzuim** (langer dan 30 dagen) is minder onderhevig aan seizoensveranderingen, waardoor er minder schommelingen te zien zijn. Het blijft rond de 4%. Het lang verzuim wordt minder veroorzaakt door infecties, maar meer door musculoskeletale aandoeningen of psychosociale klachten.

(Deze cijfers kwamen tot stand in samenwerking met drie sociale secretariaten: Acerta, SD Worx en Securex.)

Afbeelding: algemene cijfers langdurig en middellang verzuim 2021-2022



Het langdurig ziekteverzuim **ligt bij arbeiders een stuk hoger dan bij bedienden**, respectievelijk 8% tegenover 4,5%. Arbeiders verrichten fysiek zwaarder werk, vaak in minder goede werkomstandigheden, en dat zorgt voor langere afwezigheden.

Hoger verzuim in de zorgsector

In de zorgsector ligt het ziekteverzuim hoger dan in andere sectoren. Met 12% ligt het langdurig ziekteverzuim in de woonzorgcentra veel hoger dan het algemene gemiddelde. Ook het middellang verzuim ligt er, met 4%, hoger dan het gemiddelde. Bij de thuisverpleging ligt het langdurig ziekteverzuim rond de 9%. Bij de ziekenhuizen stijgen de langdurige afwezigheden gestaag: van 7,39% in januari 2021 naar 9,05% in mei 2022.

Bron: Lode Godderis^{1,2}; Johan Verbeeck³; Geert Molenberghs^{3,4}

1: Centre for Environment and Health, Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Leuven, Belgium

2: IDEWE, External Service for Prevention and Protection at Work, Heverlee, Belgium

3: Data Science Institute, I-BioStat, Universiteit Hasselt, Hasselt, Belgium

4: I-BioStat, KU Leuven, Leuven, Belgium

B. ANDERE INFORMATIE

Apenpokken

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken ('monkeypox') gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika). Besmettingen komen vooral voor bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

Op 15 juni 2022 waren er in België 52 bevestigde gevallen. Het gaat om 24 gevallen in Vlaanderen, 24 gevallen in Brussel en 4 gevallen in Wallonië. Alle gevallen zijn mannen, en de leeftijd varieert tussen 20 en 57 jaar. Eén persoon werd gehospitaliseerd, omwille van isolatie.

Een regelmatige update vindt u [op de website van Sciensano](#).

Bron: Sciensano

C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Gudrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be